

<<妇产科护理基本知识与技能450问>>

图书基本信息

书名：<<妇产科护理基本知识与技能450问>>

13位ISBN编号：9787030272683

10位ISBN编号：7030272684

出版时间：2010-5

出版时间：科学出版社

作者：张齐放，陆懿维，卢彦妍 主编

页数：161

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

随着现代医学科学的迅速发展和医学模式的转变,以及人们生活水平的不断提高和对健康认识程度的逐渐深入,护理人员应掌握更新、更全的疾病知识。

同时,由于近年来护理人才的社会需求呈现专科化、国际化的趋势,社会对护理人员的综合素质也提出了更高的要求。

为培养出符合社会、医学和护理临床需要的护理人才,编写一套具有科学性、先进性、启发性和适用性的护理学书籍迫在眉睫。

“临床护理丛书”由上海交通大学医学院附属瑞金医院具有丰富的临床护理理论与技能的护理团队集体完成,包括普通外科、心脏外科、泌尿外科等共27个分册。

本丛书编写以护理基础理论、操作技能和护理范例为框架,重在体现以人为本的宗旨,结合最新的护理理念,深层次地探讨护理的理论知识、技能及前瞻发展,力求将现代护理理论与临床实践更好地结合,帮助读者把握本学科领域的最新动态,获取最新信息。

本丛书以问答的形式介绍了各类常见护理基本问题与技能,临床治疗技术的护理配合、护理评估、护理诊断和护理措施等内容,旨在帮助临床专科护理人员掌握护理实践中遇到的具体问题,实用性较强,可作为临床各级护理人员继续教育的参考用书。

<<妇产科护理基本知识与技能450>>

内容概要

本书是“临床护理丛书”中的一册，主要针对妇产科疾病临床护理进行介绍，综合了临床护理的基础理论知识、操作技能及典型病例护理示范，涵盖了常见疾病的基本知识和实践指导，并将知识点转化为一问一答的形式，便于读者检索和学习，同时也增强了互动性，避免了传统医学书籍的冗长枯燥。本书编排重点突出，讲解深入浅出，在理论部分概括总结了护理关键点，便于读者学习掌握；在操作技能部分，以流程图的形式规范了临床常用的各项基础及专科操作，简洁实用；还提供了丰富的典型病例护理示范，归纳、总结了护理经验，可以帮助读者建立直观的认识，以便更好地理解 and 掌握理论及操作部分的内容。

本书适合护理专业的学生，妇产科新进护士、进修护士、专科护士，以及相关专业的护理工作人员阅读参考。

书籍目录

第一篇 基础理论 第一章 女性生殖系统的生理 第二章 妊娠期妇女的护理 第三章 分娩期妇女的护理 第四章 产褥期妇女的护理 第五章 新生儿的护理 第六章 月经失调的护理 第七章 生殖系统炎症的护理 第八章 性传播疾病的护理 第九章 滋养细胞疾病的护理 第十章 生殖系统肿瘤的护理 第十一章 其他生殖系统疾病的护理 第十二章 不孕症妇女的护理 第十三章 计划生育妇女的护理 第十四章 妇产科常用药物护理 第十五章 妇产科常见的化验、检查第二篇 操作技能 第十六章 专科操作技能第三篇 护理范例 第十七章 病例示范参考文献

章节摘录

插图：1) 骨盆外测量：主要测量以下几条径线。

i. 髂棘间径：孕妇取伸腿仰卧位，测量两侧髂前上棘外缘的距离，正常值为23~26cm。

ii. 髂嵴间径：孕妇体位同上，测量两侧髂嵴外缘最宽的距离，正常值为25~28cm。

此径线为几条径线中最长的径线。

以上两条径线可间接推测骨盆入口横径的长度。

iii. 骶耻外径：孕妇取左侧卧位，上腿伸直，下腿屈曲，测量第五腰椎棘突下凹陷处（相当于腰骶部米氏菱形窝的上角或相当于两髂嵴连线中点下1.5cm处）至耻骨联合上缘中点的距离，正常值为18~20cm。

此径线可间接推测骨盆入口前后径长短，是骨盆外测量中最重要的径线。

iv. 坐骨结节间径：又称出口横径。

孕妇取仰卧位，两腿屈曲，双手抱膝。

测量两侧坐骨结节内侧缘之间的距离，正常值为8.5~9.5cm，平均值9cm。

如出口横径小于8cm，应测量出口后矢状径（坐骨结节间径中点至骶尖），正常值为9cm。

出口横径与出口后矢状径之和大于15cm，一般足月胎儿可以娩出。

v. 耻骨弓角度：用两拇指尖斜着对拢，放于耻骨联合下缘，左右两拇指平放在耻骨降支的上面，测量两拇指之间的角度即为耻骨弓角度。

正常为90°，小于80°为异常。

此角度可以反映骨盆出口横径的宽度。

2) 骨盆内测量：适用于骨盆外测量有狭窄者。

检查时孕妇取膀胱截石位，外阴消毒，检查者须戴消毒手套并涂以润滑油，将食指和中指伸入阴道进行测量。

一般门诊不进行此项检查，必要时应在妊娠24周以后、会阴较松弛且不易导致感染时进行。

主要测量的径线包括骶耻内径、坐骨棘间径、坐骨切迹宽度。

(9) 阴道检查：用于了解产道、子宫、附件有无异常。

妊娠最后一个月及临产时，应避免不必要的阴道检查，如确实需要，则需外阴消毒及戴消毒手套进行，以防感染。

(10) 肛门检查：可以了解胎先露部位、骶骨前面弯曲度、坐骨棘及坐骨切迹宽度，以及骶骨关节活动度。

(11) 绘制妊娠图：将各项检查结果，如血压、体重、宫高、腹围、胎位、胎心率等填于妊娠图中，绘制成曲线图，以后每次产前检查时各项数值均作记录，观察动态变化，及早发现、及时处理孕妇或胎儿的异常情况。

<<妇产科护理基本知识与技能450>>

编辑推荐

《妇产科护理基本知识与技能450问》是临床护理丛书之一。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>