

<<植物古汉名图考续编>>

图书基本信息

书名：<<植物古汉名图考续编>>

13位ISBN编号：9787030358424

10位ISBN编号：7030358422

出版时间：2013-1

出版时间：科学出版社

作者：高明乾,卢龙斗

页数：416

字数：612000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<植物古汉名图考续编>>

内容概要

《植物古汉名图考续编》收录了植物古汉名1789个，分属于147科449属633种，附图633幅，计60余万字；对每种植物古汉名都作了注释，标明了现代汉名和世界通用的拉丁名，注明了出典或书证，传承古今，沟通中外；对每种植物的形态特征、生境产地、简要用途作了介绍，还附有植物形态图便于读者识别。

<<植物古汉名图考续编>>

作者简介

高明乾 河南师范大学生命科学学院教授、硕士研究生导师，中国植物学会会员，国家自然科学基金委员会项目评议人，原河南省生物教学研究会副理事长。

长期从事生物学教学和动植物古文化训诂研究。

先后承担国家自然科学基金、教育部和省教育厅的多项研究项目。

目前正参加国务院重大文化出版工程《中华大典·生物分典·植物分典》的编纂工作。

主编著作：《植物古汉名图考》、《诗经植物释诂》、《诗经动物释诂》、《植物学小天地》等。

发表论文：《略论植物古汉名训诂研究》、《姜科植物古汉名考证》、《植物古汉名渊源及蕴含的古文化》等60余篇。

有多项科研成果通过省级鉴定并获奖，其中一项获得河南省科技进步奖，一项获得河南省社会科学奖。

卢龙斗 河南师范大学生命科学学院院长、教授、博士、博士生导师，校学术委员会委员；曾两次受教育部派遣，赴法国巴黎十一大学和罗马尼亚雅西大学留学；现任河南省遗传学会副理事长、罗马尼亚雅西大学学报、郑州大学学报（海外版）、生物学通报、高校生物学教学研究等杂志编委。

长期从事植物遗传学和植物古文化训诂研究。

先后承担国家和省部级科研项目20多项，发表论文90多篇，获得省科技进步奖二等奖一项，省优秀教学成果奖一等奖、二等奖各一项，撰写专著和教材10部，通过省级鉴定项目5项；目前正参加国务院重大文化出版工程《中华大典·生物分典·植物分典》的编纂工作，担任编委。

<<植物古汉名图考续编>>

书籍目录

序

前言

凡例

一、二画

一颗松(1)一枝莲(1)一把伞(1)十姊妹(1)七星草(1)七星草(2)七葛根(2)丁香(2)丁香(3)丁香(3)八角镜(3)八仙草(3)八仙草(4)八担杏(4)八达杏(4)八丹杏(4)八角梧桐(4)人衔(4)人菠(4)人微(4)人菟(5)人面木(5)刀疮药(5)九层皮(6)九股牛(6)九头狮子草(6)九龙吐珠(6)九子羊(7)九里香(7)九白(7)九信菜(7)了哥王(7)

三画

四画

五画

六画

七画

八画

九画

十画

十一画

十二画

十三画

十四画

十五画

十六画

十七画

十八画

十九画以上

拉丁名索引

<<植物古汉名图考续编>>

章节摘录

植物古汉名图考续 编一、二画一、二画 【一颗松】菊花参(龙胆科) *Gentiana sarcorrhiza* Ling et Ma ex T N Ho *Gentiana sarcorrhiza* Ling et Ma ex T N Ho 名见《滇南本草》，并曰：“味苦微甘，性微寒。”

”详见金钱参条。

【一枝莲】半枝莲(唇形科) *Scutellaria barbata* D Don *Scutellaria barbata* D Don 名见《滇南本草》。详见青牛膝条。

图1一把伞(暖地大叶蕨) 【一把伞】暖地大叶蕨(真蕨科) *Rhodobryum giganteum* (Hook) Par *Rhodobryum giganteum* (Hook) Par 《植物名实图考》卷17：“一把伞生大理府石上，似峨眉万年松而白色，如牙相粘，得火可热。”

暖地大叶蕨学名中的 *Rhodobryum* 来自[希] *rhodon* 玫瑰、红色 + *bryon* 苔蕨；*giganteum* 意为巨大的。暖地大叶蕨的植物体较大，鲜绿色或褐绿色。

茎直立，具明显的横生根茎；茎下部的叶片小，鳞片状。

叶紧密贴茎部，顶叶大，簇生如花苞状，倒卵形或舌形，长15~20mm，宽4~5mm，具短尖，边缘有分化，上部有细齿，成双列，下面有时内曲，中肋长达叶尖；雌雄异株，蒴柄紫红色，直立，孢蒴圆柱形，褐色，下垂，蒴齿两层，蒴盖凸形，有短喙；孢子球形，黄棕色。

生于潮湿林地或溪边碎石缝中。

分布于中国江苏、浙江、湖南、广州、贵州、云南等地。

全草入药，有养心安神，清肝明目功效。

图2十姊妹(七姊妹) 【十姊妹】七姊妹(蔷薇科) *Rosa multiflora* Thunb var *carnea* Thory *Rosa multiflora* Thunb var *carnea* Thory 《花镜》卷5十姊妹：“十姊妹又名七姊妹。”

花似蔷薇而小，千叶馨口，一蓓十花或七花，故有此二名。

色有红、白、紫、淡紫四样。

”七姊妹学名中的 *Rosa* 来自[拉]植物原名，[凯] *rhod* 红色，此为蔷薇属；*multiflora* 意为多花的；*carnea* 意为肉色的。

七姊妹是丛状或蔓性灌木。

小枝圆柱形，有弯曲皮刺，小叶5~9个，叶片长圆形或倒卵形，长1.5~5cm，宽0.8~2.8cm，先端急尖或钝圆，基部近圆形或楔形，缘有尖锐单锯齿，托叶大部贴于叶柄；圆锥花序，多花，重瓣，粉红色，偶见白色，石竹色及紫色，花直径3~4cm，花梗无毛；果近球形，鲜红色。

产于中国陕西、河南、山东、江苏等地，各地引种栽培，花供观赏。

可作护坡及棚架之用。

【七星草】大果假瘤蕨(水龙骨科) *Phymatopteris griffithiana* (Hook) J Sm *Phymatopteris griffithiana* (Hook) J Sm 名见《本草纲目》。

详见金星草条。

【七星草】金鸡脚(水龙骨科) *Phymatopsis hastata* (Thunb) Kitagawa 名见《植物名实图考》。详见鹅掌金星草条。

图3七葛根(三裂叶蛇葡萄) 【七葛根】三裂叶蛇葡萄(葡萄科) *Ampelopsis delavayana* Planch *Ampelopsis delavayana* Planch 《草木便方》：“七葛根皮苦解毒，痈疽恶疮肿毒消，风毒游丹捣汁傅(敷)，金疮跌损煎酒服。”

三裂叶蛇葡萄学名中的 *Ampelopsis* 来自[希] *ampelos* 蔓藤 + *opsis* 相似，此为蛇葡萄属。

三裂叶蛇葡萄为攀援藤本，长达10m。

根粗壮，长柱形至纺锤形，外皮褐色，皱裂，易脱落；幼枝无毛或有微柔毛，节膨大，常带紫红色；卷须与叶对生；叶柄与叶片等长，叶片3全裂，中间小叶长椭圆形至宽卵形，顶端渐尖，基部楔形或圆形，侧生小叶斜卵形，少数成单叶或3浅裂，边缘有凸尖的圆齿，上面无毛，或在脉上有毛，下面有微毛；聚伞花序与叶对生，花淡绿色，花萼边缘稍裂，花瓣5枚，镊合状排列，雄蕊5枚，花丝极短，花盘杯状，与子房离生，花柱细长；浆果球形或扁球形，成熟时蓝紫色；种子2枚。

<<植物古汉名图考续编>>

花期5月，果期8月。

生于低山丘陵、路旁或疏林。

分布于中国四川、贵州、云南、陕西等地。

根入药，具有清热解毒、舒筋活络之功效。

图4丁香（滇丁香） 【丁香】滇丁香（茜草科）*Luculia pinceana* Hook *Luculia pinceana* Hook 滇丁香之名见于《植物名实图考》。

《滇南本草》：“丁香叶，即家中盆内栽者是。

味苦、辛、性微温。

芳香入肺，止肺寒咳嗽、或咯血、或痰上带血。

单剂，蜜炙，煎服。

”滇丁香学名中的*Luculia*来自[印]植物原名*Luculiswa*，此为滇丁香属；*pinceana*意义不详。

滇丁香是小乔木。

茎高1~2m，分枝多，小枝具细纵纹及椭圆形皮孔；单叶对生，纸质，叶片椭圆形或矩圆状倒披针形，长5~15cm，宽2~5cm，先端长渐尖，基部楔尖，全缘，叶面深绿，柄长1~2.5cm，托叶三角形，早落；聚伞花序呈伞房花序式排列，顶生，花有芳香，花5数，无毛，具短梗，萼筒状，长5~6mm，裂片披针形，花冠高脚杯状，长约4cm，通常顶端5裂，偶见6裂，裂片长椭圆形，长约1.5cm，宽约1cm；蒴果陀螺形，木质；种子有翅。

生于山坡疏林或灌丛中。

分布于中国云南、广西等地。

滇丁香叶入药，味苦、辛，性微温，治肺寒咳嗽或咯血。

本种不是桃金娘科的丁子香*Syzygium aromaticum* (L) Merr et Perry *Syzygium aromaticum* (L) Merr et Perry,也不是木犀科的紫丁香*Syringa oblata* Lindl.

【丁香】丁子香（桃金娘科）*Syzygium aromaticum* (L) Merr et Perry *Syzygium aromaticum* (L) Merr et Perry 丁子香又称支解香、母丁香、公丁香、鸡舌香、亭灵独生、瘦香娇。

《本草纲目》卷34丁香：“[释名]丁子香、鸡舌香。

[藏器曰]鸡舌香与丁香同种，花实丛生，其中心最大者为鸡舌，乃是母丁香也。

[禹锡曰]按齐民要术云：鸡舌香俗人以其似丁子，故呼为丁子香。

”丁子香学名中的*Syzygium*图5丁香(丁子香) 来自[希]*syzygois*意为愈合的，此为蒲桃属名；*aromaticum*意为芳香的。

丁子香为常绿乔木，高约10m。

叶对生，叶片长方卵形或倒卵形；顶生聚伞圆锥花序，花芳香，花萼肥厚，绿色后转紫色，长管状，花冠为白色，稍带淡紫，短管状，雄蕊多数，花药纵裂，子房下位，花柱粗厚，柱头不明显；浆果红棕色，长方椭圆形，种子长方形。

本种原产西南太平洋和摩鹿加岛，热带地区广泛栽培，中国有引种。

其花蕾入药，有温脾胃，暖肾、降逆之功效。

【丁蒿】苦远志（远志科）*Polygala sibirica* L var *megalopha* Franch *Polygala sibirica* L var *megalopha* Franch 名见《滇南本草图说》。

详见紫花地丁条。

【八角镜】鬼灯檠（虎耳草科）*Rodgersia podophylla* Cray *Rodgersia podophylla* Cray 名见《本草纲目》。

详见独角莲条。

图6八仙草（粗叶拉拉藤） 【八仙草】粗叶拉拉藤（茜草科）*Galium asperifolium* Wall *Galium asperifolium* Wall 《滇南本草》：“八仙草，味辛、苦，性微寒。

入少阳二经。

治脾家湿热，诸经客热，虚癆，童癆诸癆症、虚热、烦热，筋骨疼痛。

”粗叶拉拉藤学名中的*Galium*来自[希]*gala*牛乳，此为拉拉藤属；*asperifolium*意为粗糙叶的。

粗叶拉拉藤是一年生草本。

<<植物古汉名图考续编>>

蔓生，长0.8~1.5m，茎具纵棱，棱上有倒生短硬毛；叶4~8枚轮生，膜质，无柄，叶线状披针形，长1.8~4cm，宽3.3~6.6mm，先端具针状尖头，向下渐狭，全缘；花生于叶腋，聚伞花序，多分枝，花细小，径约1mm，萼白绿色，花瓣4枚，卵形，绿白色，有紫晕，基部联合；干果稍肉质，密生钩状白毛。

生于山野、路旁。

分布于中国云南、广西等地。

全草入药，清湿热，散淤，消肿，解毒，治淋浊、尿血、跌打损伤、肠痛、中耳炎等。

【八仙草】猪殃殃（茜草科）*Galium aparine* L *Galium aparine* L var *tenerum* (Gren et Godr) Rcb 名见《植物名实图考》。

详见拉拉藤条。

【八担杏】扁桃（蔷薇科）*Amygdalus communis* L *Amygdalus communis* L 名见《本草纲目》卷29。详见巴旦杏条。

【八达杏】扁桃（蔷薇科）*Amygdalus communis* L *Amygdalus communis* L 《钦定日下旧闻考》卷150：“原杏仁皆味苦，有一种甘者，谓之巴旦杏或谓之八达杏（长安客话）。”

”详见巴旦杏条。

【八丹杏】扁桃（蔷薇科）*Amygdalus communis* L *Amygdalus communis* L 《格致镜原》卷74：“巴旦杏一名八丹杏，出回回地。

今诸处皆有，树如杏而叶差小，实小而肉薄，核如梅皮薄而仁清甘，鲜者尤脆美，称果之佳者”详见巴旦杏条。

【八角梧桐】海州常山（马鞭草科）*Clerodendrum trichotomum* Thunb *Clerodendrum trichotomum* Thunb 名见《本草纲目拾遗》。

详见秋叶条、臭梧桐条。

【人衔】人参（五加科）*Panax ginseng* C A Mey *Panax ginseng* C A Mey 人参又称人蔘、人参、鬼盖、孩儿参、金井玉栏、海腴、神草、人微、土精、黄参、血参、地精、百尺杵、皱面还丹、王精。

《神农本草经》上品：“人参，味甘小寒。

主补五藏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。

久服轻身延年。

一名人衔，一名鬼盖。

生山谷。

”《本草品汇精要》卷7人图7人衔（人参） 参：“[名]人衔、鬼盖、神草、人微、土精、血参。

”人参学名中的*Panax*来自[拉]panax，panacea万能药，[希]pan总的+akos治愈，此为人参属名；ginseng含义不详。

人参为多年生草本，高60cm。

主根肥大，纺锤形或圆柱形；地上茎单生，有纵纹，无毛，基部有宿存鳞片；叶为掌状复叶，3~6枚轮生茎顶，叶柄长3~8cm，小叶片3~5枚，卵形或倒卵形，边缘有锯齿，齿有刺尖，上面散生少数刚毛，下面无毛；伞形花序单个顶生，花淡黄绿色，花被5枚；果实扁球形，鲜红色；种子肾形，白色。

生于海拔数百米的茂密林中，产于中国辽宁东部、吉林东半部和黑龙江东部，现吉林、辽宁栽培较多。

其根入药，有调整血压、恢复心脏功能、身体虚弱等症功效，为著名强壮滋补药。

【人蔘】人参（五加科）*Panax ginseng* C A Mey *Panax ginseng* C A Mey 《本草纲目》卷12人参：“[时珍曰]人蔘年深，浸渐长成者，根如人形，有神，故谓之人蔘、神草。

”详见人衔条。

【人微】人参（五加科）*Panax ginseng* C A Mey *Panax ginseng* C A Mey 《植物名实图考长编》卷6人参：“《别录》：微温，无毒。

疗肠胃中冷，心腹鼓痛，胸肋逆满，霍乱吐逆，调中，止消渴，通血脉，破坚积，令人不忘。

一名神草，一名人微，一名土精，一名血参。

<<植物古汉名图考续编>>

生上党山谷及辽东。

二月、四月、八月上旬采根，竹刀刮，暴干，无令见风。

” 详见人衔条。

图8人苋（铁苋菜） 【人苋】铁苋菜（大戟科）*Acalypha australis* L *Acalypha australis* L 铁苋菜又称海蚌含珠、撮斗撮金珠、六合草、半边珠、野黄麻。

《植物名实图考》卷3人苋：“人苋，盖苋之通称。

北地以色青而茎硬者当之，一名铁苋，叶极粗涩，不中食，渐出小茎，结籽甚细。

江西俗呼海蚌含珠，又曰撮斗撮金珠，皆肖其形。

” 铁苋学名中的*Acalypha*来自[希]植物原名，荨麻，a无+kalos美的+aphe触觉，铁苋菜属；*australis*意为南方的。

铁苋菜为一年生草本，高30~50cm，小枝细长，被柔毛；叶互生，卵状菱形至椭圆形，边缘有钝齿，两面有毛或近于无毛；花单性，雌雄同株，穗状花序腋生，雄花序极短，生于极小的苞片内，雌花序生于叶状苞片内；蒴果小，三角状半圆形，被粗毛；种子卵形，长约2mm，灰褐色。

生于旷野、路边较湿润的地方。

分布于中国黄河流域中下游及长江以南各地。

全草入药，有清热、利水、杀虫、止血之功效。

【人面木】人面子（漆树科）*Dracontomelon duperreanum* Pierre *Dracontomelon duperreanum* Pierre

《广群芳谱》卷81：“人面木出于林州，春花夏实，秋熟，两边似人面，故以名之。

” 人面子学名中的*Dracontomelon*来自[希]*drakontia*小龙 + *melon*苹果，此为人面子属。

人面子为常绿大乔木，高达20余米。

幼枝具条纹，被灰色绒毛；奇数羽状复叶，图9人面木（人面子） 长30~45cm，小叶5~7对，互生，近革质，长圆形，全缘，两面均无毛而网脉明显，叶背脉腋具灰白色髯毛，侧脉8~9对；圆锥花序顶生或腋生，被柔毛，花白色，长3.5~4mm，钟形，萼5裂，裂片阔卵形，被柔毛，花瓣5枚，披针形，花丝线状，花药长圆形，花盘杯状，雄蕊10枚，着生于花盘基部，子房上位，5室；核果扁球形，直径约2cm，黄色；种子3~4粒。

花期春夏。

生于平原、丘陵、村旁、河边、池畔等处。

分布于广东、广西等地。

其果肉可食，入药能醒酒解毒，根皮也可入药。

【刀疮药】贯筋藤（萝藦科）*Dregea sinensis* Hemsl var *corrugata* (Schneid) Tsiang et P T Li *Dregea sinensis* Hemsl var *corrugata* (Schneid) Tsiang et P T Li 《植物名实图考》卷23刀疮药：“刀疮药生云南。

藤本蔓生，赭绿茎。

叶似何首乌，色绿，微宽，无白脉。

叶间开花，五瓣，叶白，内紫，纹如荆葵，数十朵簇聚为球。

又名贯筋藤，殆能入筋络之品。

” 贯筋藤学名中的*Dregea*来自[德]人名JF Drege，图10刀疮药（贯筋藤） 此为南山藤属；*sinensis*意为中国的；*corrugata*意为皱褶的。

贯筋藤是木质攀援藤本。

茎具皮孔，幼枝具褐色绒毛；叶对生纸质，卵状心形，长5~11cm，宽4~6cm，叶背有绒毛，先端渐尖，基部心形；聚伞花序伞形状，有花20余朵，萼裂片卵状长圆形，基部有5个腺体，花冠内紫外白，辐状；蓇葖果披针形，长5~6cm，外果皮具横凸起的皱褶，子房被柔毛。

花期3~5月，果期7~12月。

生于山地灌丛。

产于中国云南、贵州、四川、陕西、甘肃等地。

全草入药，可催乳、止咳、祛风湿，叶外敷治痈疖、骨折等。

【九层皮】苹婆（梧桐科）*Sterculia nobilis* Smith *Sterculia nobilis* Smith 《思恩府志》：“罗晃子，俗称九层皮，形似蚕豆可茹，味如煨栗。

<<植物古汉名图考续编>>

外有黑光，连肉有皮九层，故名，产于山树（林）中。

” 详见罗晃子条。

【九股牛】狗筋蔓（石竹科）*Cucubalus baccifer* L *Cucubalus baccifer* L 《滇南本草》（整理本）小九牯牛：“ 别名九股牛、土参条、小被单草、小九股牛、狗筋蔓、小九古牛。

” 详见小九牯牛条。

【九头狮子草】不育红（唇形科）*Rabdosia yuennanensis* (Hand ?Mazz) Hara *Rabdosia yuennanensis* (Hand ?Mazz) Hara 名见《滇南本草》。

详见狮子草条。

图11九龙吐珠(风车草) 【九龙吐珠】风车草（莎草科）*Cyperus alternifolius* L subsp *flabelliformis*(Rottb K ü kenth) *Cyperus alternifolius* L subsp *flabelliformis*(Rottb K ü kenth) 《泉州本草》：“ 治蛇虫咬伤，干（九龙吐珠）全草120g,浸酒600g，两星期可用。

凡用取药抹伤口，如系蛇咬伤，除外涂后，并将此酒内服1小杯。

” 风车草学名中的*Cyperus*来自[希]kypeiros莎草、藎草，此为莎草属（莎草科）；*alternifolius*意为叶互生的。

风车草为多年生草本植物。

须根坚硬；根状茎短粗，秆粗壮，丛生，高30~150cm，近圆柱形，无叶片；叶鞘棕色，包裹茎的基部；苞片20枚，长几相等，较花序长约2倍，宽2~11mm，向四周展开，平展，雄蕊3枚，花药线形，顶端具毛状附属物，花柱短，柱头3数；小坚果椭圆形，近于三角形，长为鳞片1/3，褐色。

广泛生于森林、草原地区的大湖、河流边缘的沼泽中。

中国南北各省均见栽培。

有观赏价值。

.....

<<植物古汉名图考续编>>

编辑推荐

《植物古汉名图考续编》是《植物古汉名图考》的续编书，会给生物学、农学、医药学、林学、花卉学、文学、史学、地理学等工作带来莫大的方便。

<<植物古汉名图考续编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>