

<<精神科用药>>

图书基本信息

书名：<<精神科用药>>

13位ISBN编号：9787506744782

10位ISBN编号：7506744783

出版时间：2010-6

出版时间：中国医药科技出版社

作者：张华峰 主编

页数：294

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<精神科用药>>

前言

我国目前精神类疾病患者约有1600万人，还有约600万名癫痫患者。

神经精神类疾病在我国疾病总负担中排名首位，约占疾病总负担的20%。

此外，受到情绪障碍和行为问题困扰的17岁以下儿童和青少年约3000万人。

随着人民生活水平的提高，人们对健康有了更高的要求，因此如何使药品安全有效地用于精神类疾病，成为人们的愿望。

我们采取了以病带药的写法，通过对疾病约简单描述将精神科所使用的药物做全面的介绍。

为了便于读者对治疗方案有较为全面的了解，我们也将各类型药物的用药原则、换药问题、联合用药及特殊人群治疗在每个章节中做详细的介绍。

近年来，精神类疾病的治疗方法取得了前所未有的发展，尤其在药物的治疗上。

发展了一系列称之为第二代的抗精神病药与抗抑郁药，使得一些精神类疾病有了较好的控制方法。

<<精神科用药>>

内容概要

本书是简明临床用药口袋丛书之一，根据精神类常见疾病分为八章，共收录精神类临床治疗常用药物百余种。

收载的药品既包括临床常用的成熟品种，也有较新的药品，内容紧密结合临床工作，重点介绍医护人员在实际应用药品时(开药、发药等)涉及到的药品信息，偏重于药品的使用方法和用药提示。主要为临床专科医生、护士、药师(主要是临床专科医生)提供用药参考信息。

<<精神科用药>>

书籍目录

第一章 精神分裂症和其他精神病性精神障碍第二章 双相障碍第三章 抑郁障碍第四章 焦虑障碍第五章 睡眠障碍第六章 注意缺陷与多动障碍第七章 老年性痴呆第八章 药物依赖与防治

章节摘录

甲状腺激素主要有甲碘氨（T3）和甲状腺素（T4）。

与心境稳定剂联用治疗难治性双相快速循环型，也可作为抗抑郁剂的增效剂治疗双相型障碍的难治性抑郁患者。

吲哚洛尔对RRRIS抗抑郁剂的增效作用已有一些开放性研究说明其有效。

药物联合治疗的组合要注意药物的相互作用，常用的组合有：碳酸锂可与丙戊酸盐、传统或第二代抗精神病药、拉莫三嗪、加巴喷丁、苯二氮革类药联用。

丙戊酸盐可与传统或第二代抗精神病药、拉莫三嗪、加巴喷丁、苯二氮革类药联用。

卡马西平可与第二代抗精神病药、拉莫三嗪、加巴喷丁、苯二氮革类药联用。

卡马西平可使托吡酯的血药浓度下降约50%，不宜联用。

（四）双相障碍的维持治疗双相障碍是一种复发性情感障碍，极少单次发作后不再复发。

首次发作在症状缓解后应巩固治疗3~6个月，特别是双相抑郁发作应巩固治疗6个月以上。

在第二次发作后就应该开始预防复发的维持治疗。

如首次发作严重并带有分裂特点，或发病急又没有明显诱因，此种情况复发的危险性更大，首次发作后也应进行维持治疗。

在维持治疗期，对原治疗措施在密切观察下进行适当调整，减去在联合治疗中的非心境稳定剂，或相应减少心境稳定剂的剂量。

不能骤停碳酸锂，否则可能出现撤药性躁狂发作。

临床实践经验说明，使用接近治疗剂量者比低于治疗剂量者的防复发放果要好。

<<精神科用药>>

编辑推荐

《精神科用药》：用药信息，快速查阅。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>