

<<2011护理学>>

图书基本信息

书名：<<2011护理学>>

13位ISBN编号：9787509143063

10位ISBN编号：7509143063

出版时间：2010-10

出版时间：人民军医出版社

作者：周璇，贾国芹 主编

页数：全七册

字数：520000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《2011护理学（师）模拟试卷及解析（试卷袋）》紧扣考试大纲，内容的安排既考虑知识点的全面性，又结合考试实际，突出重点、难点，在编写形式上力求便于考生理解和记忆，使考生在有限时间内扎实掌握大纲所要求的知识，顺利通过考试。

书籍目录

护理学（师）模拟试卷及解析
护理学专业初级（师）资格考试 模拟试卷一
护理学专业初级（师）资格考试 模拟试卷二
护理学专业初级（师）资格考试 模拟试卷三
护理学专业初级（师）资格考试 模拟试卷四
护理学专业初级（师）资格考试 模拟试卷五
护理学专业初级（师）资格考试 考前自测卷

<<2011护理学>>

章节摘录

1.D。

豆腐渣样为真菌性阴道炎；脓性可为细菌性或老年性阴道炎；泡沫状为滴虫阴道炎；血性的可为老年性阴道炎。

2.B。

雌激素使子宫内膜呈增生期变化；孕激素使子宫内膜呈分泌期变化。

3.C。

阴道为女性内生殖器。

4.A。

正常妊娠期血浆蛋白降低，主要是白蛋白减少；血沉加快；红细胞、白细胞增多；纤维蛋白增多。

5.B。

宫内节育器主要是通过阻止受精和干扰受精卵着床避孕，不影响排卵。

6.B。

妊娠高血压的主要病理变化是全身小动脉痉挛，硫酸镁是首选的解痉药。

7.B。

煮沸时在水中加入1%~2%碳酸氢钠，沸点可达105℃，除增强杀菌作用外，还有去污防锈的作用。

8.D。

ABC属于肾前性，E属于肾后性。

9.C。

高钾血症是少尿期最主要和最危险的并发症，高钾血症、水中毒是肾衰竭早期死亡最常见的原因。

10.E。

能预防局麻药中毒的术前用药是苯巴比妥钠。

11.D。

硫喷妥钠为一速效的巴比妥类药，对呼吸中枢有明显的抑制作用，特别是当静脉注射速度过快时更为显著。

对交感神经有抑制作用，而使副交感神经相对兴奋，因此易发生喉痉挛及支气管痉挛。

12.C。

利多卡因：是抗心律失常的首选药物，能抑制心室的异位激动，有治疗室颤作用。

13.B。

丹毒是皮内网状淋巴管受乙型溶血性链球菌侵袭所致。

常有皮肤或黏膜破损，如足癣、口腔溃疡等。

此病菌毒力强，蔓延快，好发于下肢和面部。

14.C。

破伤风的病菌是破伤风梭菌，为专性厌氧菌，革兰染色阳性，以芽胞状态存在于自然界。

15.A。

BCD属抗代谢类，E属于抗生素类。

16.B。

皮脂腺囊肿又称粉瘤，非真性肿瘤，为皮脂腺外口阻塞所形成。

17.C。

表层皮片为表皮及少量真皮乳头层；中厚皮片含表皮及部分真皮层；全厚皮片包括全层皮肤。

18.A。

乳癌最多见于乳房外上象限（45%~50%），其次是乳头、乳晕和内上象限。

19.D。

常见的致病菌有肺炎球菌、链球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等，由于抗生素的应用，耐药性的金黄色葡萄球菌引起的脓胸大大增加。

20.B。

<<2011护理学>>

股疝为疝囊通过股环、经股管向股部卵圆窝突出形成的疝。

多见于40岁以上妇女。

在腹外疝中，股疝最易发生嵌顿。

21.E。

原发性腹膜炎与继发性腹膜炎区别为有无腹腔原发病灶，ABCD均引起继发性腹膜炎。

22.D。

胃癌好发于胃窦部，约占50%，其次为贲门部。

23.D。

肛瘘多因直肠肛管周围脓肿切开或自行破溃后，感染迁延不愈而成。

24.A。

胃底和食管下端静脉曲张，吞咽生硬食物极易破裂，引起急性大出血。

25.C。

交替脉：脉搏一强一弱交替出现但节律正常，见于高血压性心脏病、急性心肌梗死、心肌炎等。

交替脉是左心衰竭的重要体征。

26.E。

深昏迷：意识全部丧失，对强烈刺激也无反应，瞳孔散大，所有反射均消失。

27.C。

病危面容：病人面容枯槁，面色灰白或发绀，表情淡漠，眼眶凹陷，皮肤湿冷，大汗淋漓。

见于严重脱水、出血、休克等病人。

28.E。

语颤增强见于肺组织炎症或肺实变的病人。

29.B。

变态反应发病机制：哮喘主要由接触变应原触发或引起。

30.D。

已经公认吸烟是肺癌的重要危险因素。

31.A。

呼吸道感染是最常见、最重要的诱因。

32.E。

风心病常见病因是风湿热，多有反复链球菌扁桃体炎或咽峡炎史。

33.D。

冠状动脉粥样硬化引起血管腔狭窄和痉挛。

34.C。

上消化道出血的最常见病因是消化性溃疡、食管胃底静脉曲张破裂、急性胃黏膜损害和胃癌。

35.B。

引起肝硬化的病因很多，在我国以病毒性肝炎所致的肝硬化为主，国外以酒精中毒多见。

36.C。

肾盂肾炎致病菌以大肠埃希菌最为多见，其次为副大肠埃希菌、变形杆菌、葡萄球菌、铜绿假单胞菌。

37.D。

肺心病是指由支气管~肺组织，胸廓或肺动脉系统病变所致肺血管阻力增加，产生肺动脉高压等多种因素的心脏病。

38.A。

慢性胃炎绝大多数由Hp感染引起。

39.B。

大多数病因不明，仅少数是急性肾炎发展所致，发病的起始因素是免疫介导炎症，多数病例肾小球内有免疫复合物沉积。

40.D。

<<2011护理学>>

各种病因所致的甲亢中，以Graves病最多见。

GD发生的基本因素是一种伴TH合成、分泌过多，与遗传和人类白细胞抗原（HLA）有关，属于Ts细胞功能缺陷的器官特异性自身免疫性疾病。

41.A。

慢性阻塞性肺气肿多由慢性支气管炎发展而来。

42.B。

高血压和动脉硬化为脑出血最常见的原因。

43.B。

婴幼儿百日咳、麻疹、支气管肺炎是支气管肺组织感染所致支气管扩张最常见的原因。

44。

C。

急性心肌梗死是指冠状动脉血供急剧减少或中断，使相应心肌发生持久的缺血导致心肌坏死。

45.D。

慢性失血是缺铁性贫血的主要病因。

46。

E。

目前公认糖尿病不是惟一病因所致的单一疾病，而是复合病因的综合征，与遗传、自身免疫和环境等因素有关。

47.A。

发病机制可能是由于具有遗传素质者，在某些因素作用下，促发了异常的免疫应答，而持续产生大量的免疫复合物和致病性自身抗体，引起组织损伤。

48.B。

四肢对称性迟缓性瘫痪，从下肢开始，下肢重于上肢，从远端向近端发展，如呼吸肌瘫痪可引起呼吸困难。

49.D。

小儿年龄时期分为7个年龄期。

胎儿期：从卵和精子结合到小儿出生，此期大约40周（280d）。

新生儿期：自出生后脐带结扎时起到足28d。

婴儿期：自出生到满1周岁。

幼儿期：1周岁后到满3周岁。

学龄前期：3周岁后到入学前（6~7岁）。

学龄期：6~7岁到13~14岁。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>