

<<临床药物手册>>

图书基本信息

书名：<<临床药物手册>>

13位ISBN编号：9787534579073

10位ISBN编号：7534579074

出版时间：2012-9

出版时间：江苏科学技术出版社

作者：许迪 等主编

页数：762

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<临床药物手册>>

内容概要

许迪、丁国宪主编的《临床药物手册（实用版）》这本内容新颖、易于查阅的药物手册共介绍药物1000余种，以临床常用的西药为主，对部分临床应用较为广泛的中成药也作了简要的介绍。尽量收入新药，包括数十种FDA近年批准上市的新药，无临床实用价值或者废弃不用的药品不予录入。

本书介绍药物的基本内容包括：剂型规格、作用用途、临床应用、不良反应、注意事项。同一药物如有多个用途，则在主要类别中评述，而在其他类别中简述或注明参见页数。书中所述剂量为常用量，对于某些药物，特别是毒性反应较大，安全范围较小的药物，务必遵循个体化的原则，谨慎使用。在用法中如果未注明系儿童用量和给药途径时，均为成人口服剂量。

<<临床药物手册>>

书籍目录

- 一、抗微生物感染药
 - 二、抗寄生虫药
 - 三、麻醉用药
 - 四、中枢神经系统药
 - 五、心血管系统药
 - 六、拟胆碱药与抗胆碱药
 - 七、解痉药
 - 八、血液及造血系统药
 - 九、消化系统药
 - 十、呼吸系统药
 - 十一、利尿药
 - 十二、抗肿瘤药物
 - 十三、激素类药
 - 十四、抗骨质疏松症药
 - 十五、降血糖药
 - 十六、抗甲状腺药
 - 十七、抗变态反应药
 - 十八、前列腺素类药物
 - 十九、良性前列腺增生用药
 - 二十、肾脏病其他用药
 - 二十一、诊断用药
 - 二十二、其他类别药物
 - 二十三、特殊解毒药
- 附录：儿科常用药物
中文药名索引
外文药名索引

<<临床药物手册>>

章节摘录

版权页：【临床应用】成人常用剂量：一日200~400 mg，剂量>200 mg宜分2次给药。

足趾甲癣：一次200 mg，一日1次，连用12周；手指甲癣：一次200 mg，一日2次，一个疗程7日，停药21日后再予以第2个疗程。

【不良反应和注意事项】不良反应：常见有胃肠道不适如消化不良、恶心、腹痛和便秘等。

较少见头痛、可逆性血清氨基转移酶升高、月经紊乱、头晕和过敏反应。

极个别可发生外周神经病变和多形性红斑等。

可出现视觉障碍，耳鸣，短暂性或永久性听力丧失。

长期治疗（大约1个月）的患者可发生低血钾症、水肿、肝炎和脱发等症状。

注意：对本品过敏者、孕妇甲癣患者禁用。

禁止与某些经P450代谢的药物共用，因可使其血药浓度增高，导致严重的、危及生命的心律失常。

特别禁止与特非那丁、阿司咪唑、三唑仑、咪达唑仑和西沙比利合用。

应用本品治疗期间应停用洛伐他汀、辛伐他汀。

不宜用于充血性心力衰竭患者及有该病史的心室功能障碍者。

肝酶升高、有活动性肝病或其他药物所致肝毒性损伤病史者不宜使用。

伏立康唑 Voriconazole【别名】威凡，Vfend【剂型规格】片剂：200 mg；注射剂：200 mg【作用用途】本品是一种广谱的三唑类抗真菌药，作用机制是抑制真菌中由细胞色素P450介导的14- α -甾醇去甲基化，从而抑制麦角甾醇的生物合成。

本品对念珠菌属（包括耐氟康唑的克柔念珠菌，光滑念珠菌和白念珠菌耐药株）具有抗菌作用，对所有检测的曲霉属真菌有杀菌作用。

适用于：侵袭性曲霉病。

治疗对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）。

治疗由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。

本品应主要用于治疗免疫缺陷患者中进行性的、可能威胁生命的感染。

【临床应用】静滴前先溶解成10 mg/ml，再稀释至2~5 mg/ml。

不宜用于静注。

建议静滴速度最快不超过每小时3 mg/kg，稀释后每瓶滴注时间须在1~2小时以上。

（1）成人，无论是静滴或口服给药，首次给药时第1天均应给予首次负荷剂量，以使其血药浓度在给药第1天即接近于稳态浓度。

由于口服片剂的生物利用度很高（96%），所以在有临床指征时静滴和口服两种给药途径可以互换。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>