

<<社区医生用药手册>>

图书基本信息

书名：<<社区医生用药手册>>

13位ISBN编号：9787535760746

10位ISBN编号：7535760740

出版时间：2010-5

出版时间：湖南科技出版社

作者：彭六宝，朱运贵 主编

页数：419

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<社区医生用药手册>>

内容概要

本书从社区卫生服务的实践出发，以推动社区卫生服务“实务”发展为目的，根据卫生部和国家中医药管理局组织制定的《社区卫生服务机构用药参考目录》而编写，强调实用性，简单扼要，通俗易懂。

本书紧密结合临床实际，阐述了用药的有关知识、特点、合理用药及药物相互作用等内容。

为使社区医务工作人员能准确掌握与合理使用相关药品，书中化学药部分介绍了药品的临床常用品名、制剂与规格、临床应用、用药提示等，中成药部分则介绍了药物的组成、功用、剂型规格、用法用量、用药须知等。

<<社区医生用药手册>>

书籍目录

化学药部分 第一章 抗微生物药 1 青霉素G 2 青霉素V 3 阿莫西林 4 阿莫西林
/克拉维酸 5 头孢氨苄 6 头孢羟氨苄 7 头孢唑林 8 头孢拉定 9 头孢呋辛
10 头孢克洛 11 头孢曲松 12 庆大霉素 13 四环素中成药部分英文药名索引
中文药名汉语拼音索引

章节摘录

本品不良反应较多, 常见有腹泻、腹胀、口苦、口干, 转氨酶轻度升高, 偶见严重肝炎、肝坏死、肝脂肪变性、急性胰腺炎等。

偶致急性间质性肾炎, 停药后肾功能一般均可恢复正常。

可引起骨髓抑制, 出现粒细胞减少、血小板减少、再生障碍性贫血。

可有心动过缓、面部潮红等。

静脉注射时偶见血压骤降, 房性期前收缩, 心跳呼吸骤停。

可致头晕、头痛、疲乏、嗜睡等, 少数患者出现不安、感觉迟钝、语言含糊不清、出汗、局部抽搐或癫痫样发作以及幻觉、妄想等症状。

老年患者更易发生毒性反应, 出现眩晕、谵妄等症状。

剂量过大时可致呼吸短促或呼吸困难; 心动过速。

用药剂量较大时, 可引起男性乳房发育、阳痿、精子计数减少、女性溢乳、性欲减退等。

还可抑制皮脂分泌, 诱发剥脱性皮炎、皮肤干燥、脱发、口腔溃疡等。

如必须与制酸药合用, 应间隔至少1小时。

与华法林类抗凝药并用, 可使后者自体内排出率下降, 导致出血倾向; 与氨基苷类抗生素合用时可能导致呼吸抑制或呼吸停止; 可使胃液pH值升高, 能提高阿司匹林的吸收率, 使阿司匹林的作用增强; 与茶碱、咖啡因、普萘洛尔、苯妥英钠、苯二氮革类等合用, 能增加这些药物的血药浓度。

<<社区医生用药手册>>

编辑推荐

《社区医生用药手册》是由湖南科学技术出版社出版的。

<<社区医生用药手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>